

Control rápido y confiable del cortisol ^{1,2}

Indicado para:

- Tratamiento de pacientes con síndrome de Cushing endógeno.³
- Prueba diagnóstica para la insuficiencia de hormona adrenocorticotrópica (ACTH) y en el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing dependiente de ACTH.³

Presentación:

- 50 cápsulas blandas x 250 mg.



Material para uso exclusivo del profesional de salud. Prohibida su exhibición y/o entrega a pacientes, consumidores y/o al público general.
Para mayor información, contactar a Celnova Pharma: argentina@celnova.com. Celnova Argentina S.A.
San Vladimiro 3056, San Isidro. Buenos Aires - Argentina.
Para acceder a la información del producto, escanee el código QR, o ingrese a nuestra web www.celnova.com
Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

1. Nieman et al. Eur J Endocrinol. 2025;193(3):391–402.
2. Daniel et al. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(11):4146–4154.
3. Prospecto según versión vigente de ANMAT.
4. Ceccato et al. Endocrine. 2018;62(3):701–711.
5. Verhelst et al. Clin Endocrinol (Oxf). 1991;35(2):169–178.
6. Castinetti. Arch Med Res. 2023;54(8):102908.
7. Al-Salama et al. Drugs Ther Perspect. 2021;37(9):393–406.
8. Oster et al. Endocr Rev. 2017 Feb 1;38(1):3–45.



Metopirone®: un tratamiento eficaz y seguro para pacientes con síndrome de Cushing.^{1,3}

Más de 6 décadas de experiencia y múltiples estudios respaldan el uso a **corto y largo plazo** de Metopirone® en pacientes con síndrome de Cushing.^{1,2,4,5,7}

**PRIMER MES DE
TRATAMIENTO CON
METOPIRONE®**



CLU
-67%




CSN
-57%



El tratamiento con Metopirone® ofrece normalización rápida y sostenida del CLU/CSN.⁴



La hipersecreción de cortisol puede **alterar el ritmo circadiano**, lo cual ha sido considerado característico del síndrome de Cushing.⁸



El tratamiento con Metopirone está asociado con la restauración del ritmo circadiano del cortisol

La dosificación flexible posibilita una administración ajustada según el momento del día: una proporción mayor de Metopirone® en horario vespertino favorece la restauración del perfil circadiano del cortisol.^{1,4,6}