



1

**ABIRANOVA**

**ABIRATERONA ACETATO 250 mg**

Comprimidos

Venta Bajo Receta Antivida Industria Argentina

---

<p><b>Composición por comprimido:</b></p> <p>Abiraterona Acetato ..... 250 mg</p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>
--	---	---

**Acción Farmacológica:** Inhibidor de la síntesis de andrógenos (SI-1). (L01AB01)

**Indicaciones:** Tratamiento de la hiperandrogenia en el síndrome de ovario poliquístico (SOP) en mujeres con hiperandrogenismo sintomático.

**Contraindicaciones:** Hipertensión arterial, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, embarazo, lactancia materna, uso concomitante con inhibidores de la HMG Co-Sintetasa (HMG-CoA reductasas).

**Precauciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Interacciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Embarazo y lactancia:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Condiciones de conservación:** Conservar en su envase original a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), protegido de la humedad y de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación:** Comprimidos de 250 mg, en envases de 30 y 60 unidades.

**Fecha de autorización:** 15/03/2015

**Fecha de revisión:** 15/03/2015

**Fecha de vigencia:** 15/03/2015

2

**ABIRANOVA**

**ABIRATERONA ACETATO 250 mg**

Comprimidos

Venta Bajo Receta Antivida Industria Argentina

---

<p><b>Composición por comprimido:</b></p> <p>Abiraterona Acetato ..... 250 mg</p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>
--	---	---

**Acción Farmacológica:** Inhibidor de la síntesis de andrógenos (SI-1). (L01AB01)

**Indicaciones:** Tratamiento de la hiperandrogenia en el síndrome de ovario poliquístico (SOP) en mujeres con hiperandrogenismo sintomático.

**Contraindicaciones:** Hipertensión arterial, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, embarazo, lactancia materna, uso concomitante con inhibidores de la HMG Co-Sintetasa (HMG-CoA reductasas).

**Precauciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Interacciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Embarazo y lactancia:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Condiciones de conservación:** Conservar en su envase original a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), protegido de la humedad y de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación:** Comprimidos de 250 mg, en envases de 30 y 60 unidades.

**Fecha de autorización:** 15/03/2015

**Fecha de revisión:** 15/03/2015

**Fecha de vigencia:** 15/03/2015

3

**ABIRANOVA**

**ABIRATERONA ACETATO 250 mg**

Comprimidos

Venta Bajo Receta Antivida Industria Argentina

---

<p><b>Composición por comprimido:</b></p> <p>Abiraterona Acetato ..... 250 mg</p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>	<p><b>Industria Argentina:</b></p> <p>Excipientes ..... 100 mg</p> <p>Características físicas ..... 10 mg</p>
--	---	---

**Acción Farmacológica:** Inhibidor de la síntesis de andrógenos (SI-1). (L01AB01)

**Indicaciones:** Tratamiento de la hiperandrogenia en el síndrome de ovario poliquístico (SOP) en mujeres con hiperandrogenismo sintomático.

**Contraindicaciones:** Hipertensión arterial, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, embarazo, lactancia materna, uso concomitante con inhibidores de la HMG Co-Sintetasa (HMG-CoA reductasas).

**Precauciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Interacciones:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Embarazo y lactancia:** El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño. El uso de Abiraterona Acetato puede causar hipotensión ortostática, especialmente al levantarse de la cama o al salir de un baño.

**Condiciones de conservación:** Conservar en su envase original a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), protegido de la humedad y de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Presentación:** Comprimidos de 250 mg, en envases de 30 y 60 unidades.

**Fecha de autorización:** 15/03/2015

**Fecha de revisión:** 15/03/2015

**Fecha de vigencia:** 15/03/2015

4

**ABIRANOVA**

**ABIRATERONA ACETATO 250 mg**